



 Harvard Medical Library  
in the Francis A. Countway  
Library of Medicine ~ Boston

VERITATEM PER MEDICINAM QUÆRAMUS



Digitized by the Internet Archive  
in 2011 with funding from  
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School



*ABR. an L.*

MARTINI LANGE  
MEDICINAE DOCTORIS CORONA  
TRANSYLVANIA

RUDIMENTA  
DOCTRINAE  
DE  
PESTE.



---

VIENNAE  
APVD RUDOLPHVM GRAEFFER.

1784.

HARVARD UNIVERSITY  
SCHOOL OF MEDICINE AND PUBLIC HEALTH  
LIBRARY

**EXCELENTISSIMO**

**A C**

**ILLUSTRISSIMO DOMINO**

**SAMUELI LIBERO BARONI**

**D E**

**BRVCKENTHAL,**

**SAC. CAES. REG. ET APOST. MAI.**

**ACT VALI INTIMO STATVS**

**C O N S I L I A R I O ,**

**INSIG. ORD. S. STEPH. REG. APOST.**

**COMENDATORI,**

**PER MAGNUM PRINCIPATVM TRAN-**

**SYLVANIAE PARTESQUE EIDEM**

**REAPPLICAT.**

**GVBERNATORI REGIO,**

**E T**

**EXCELSI REGII G VBERNIE**

**P R A E S I D I &c. &c.**

O B

TOT ET TANTA

I N

CAESAREM PATRIAM

E T

ARTEM SALVTIFERAM

M E R I T A

H V N C C E L I B E L L U M

SEQVE SIMVL TOTVM

I N

TESSERAM PIETATIS , ET VENERATIONIS

D. D. D.

*humillimus*

Author,

---

## PRAEFATIO.

**E**n, lector benevole! rudimenta doctrinæ de peste methodo systematica adornata, manca quidem adhuc, omnia tamen primis lineis continentia, quæ de pestilenta, omissis multis fabulosis præteritis temporibus laudata, jure notari merentur, & ad nostra usque tempora ab optimis in arte medica viris annotata sunt. Occasionem earum lucubrandarum mihi dedit Patria, situsque Patriæ cum affinibus terris turcicis vicinus, in quibus endemiam esse pestem constat, adeoque inde per commercia facile in nostras terras transportari potest dira hæc lues: quamvis aula nostra benignissima per adornatas continuas excubias secundum lineus & quarantænam eæ a finibus nostris

avertendæ studeat. Etenim hoc solo sæculo quoties in Transylvania dira hæc lues, maxima certe vitæ humanæ inimica, grassata est! annotata legitur anno 1708, 1718, 1738, 1756, 1770, quæ vero ultima in primis incunabulis ob optimas separationes locorum pestilentialium sat cito extincta est. Prima hujus sæculi pestis anni nempe 1708 occasionem dedit medico Transylvano Koleseri libellum conscribere sub titulo: Pestis dacicæ scrutinium 1709. Historiam pestis 1718, in qua 18088 homines Coronæ mortui sunt, quondam apud nos Cel. physicus academiæque naturæ curiosor socius Albrich conscripsit, & in manuscripto reliquit, ex quo quædam notatu digna dianogfin. morbi spectantia excerpti, & sparsim in hoc meo libello produxi. Epidemiam anni 1756 descripsit Cel. noster Chenot elegantissimus de peste scriptor.

Cum

Cum mihi itaque ex academiis reduci vivendum esset in loco, ubi continuus pestis metus est, necessarium esse duxi, veram mihi de peste cognitionem, saltem theoreticam acquirere. Pervolvi igitur horis a praxi vacuis optimos de peste scriptores, quæque mihi notatu digniora videbantur his pægellis ordine accuratim collegi, pestem in veras suas distinctas species divisi, quæque vera de remediis adversus pestem dici posunt, conscripsi.

Huncce in proprium usum primo conscriptum libellum tibi nunc sisto lector benevole! sperans etiam aliis quidquam emolumenti ad acquicendam de peste accuratiorem cognitionem praestitum fore, uti ad ulterius enucleandam pestis doctrinam, praesertim naturæ miasmatis pestilentialis, specificique contra eam remedii, respondentis notioni ejusdem

dem naturæ veræ; quæ, ut aper-  
te fatear, hucusque ignota me-  
dicis mansit, causamque constituit,  
quare a peste correptorum tam  
pauci evadant.

Gratulabor mihi multum, si  
hocce libello quidquam ad salu-  
tem proximi contulero, lectorum-  
que desiderio aliquatenus satis-  
fecero.

Dabam Coronæ in Transylvania  
1783 die 22 Octobris,



## §. I.

### *Notio Pestis.*

**P**estis est summus gradus febrium omnium malignarum contagiosarum & epidemicarum cum bubonibus & Carbunculis.

## §. II.

### *Enucleatio characterum, Pestis notionem ingredientium.*

i. Omnem prorsus Pestem cum febre occurrere contendō, Symptomata ejus essentia-

A. tialia

tialia ex capite de Diagnosi abunde id evincunt. Naturæ Conamen esse dicitur omnis febris, quo impura a puris separet & per consueta colatoria morbosum ex corpore humano educat, id quod in peste contingit vel expulsione per sudores, vel depositione per Bubones & Carbunculos, ut plurimum utrisque, a) nihilominus saepè fere omnes peste correpti extinguentur: superat enim ferocia mali tam naturæ, quam Medicamentorum vires, & mortem ita popularem inducit.

Diversa, major, minor est febris pro diversa miasmatis pestilentialis volatilitate, tenacitate, copia, benignitate, & malignitate, dispositione ac statu corporis, aere, epidemiis, nec non complicazione cum aliis morbis. Multifaria hinc etiam febris est. Si enim miasma pestilentiale migret in Corpus forte plethoricum, febris pestis erit inflammatoria,

---

a) Ideo pestis inter exanthematicas febres classificatur.

ria; si in corpus cum sanguine dissoluto  
rit putrida; si in debile, aquosum, ir-  
ritabile, pallidum, molle, erit nervosa;  
si in corpus bile turgens, biliosa. Com-  
plicata erit febris, si harum febrium spe-  
cies aliquæ conjugantur. Complicatis  
frequentissima ex iis est pestis putrida  
nervosa, rarius inflammatoria vel biliosa.  
Hyeme sæpius est pestis inflammatoria,  
æstate prætrida; & autumno biliosa.  
Hyeme enim miasma pestilentiale mitius,  
sanguis densior, fibræ corporis strictio-  
res; æstate vero volatilius, acrius mali-  
gnius & Humores a Calore in putredi-  
nem plus vergentes.

Duplex vero in peste occurrit fe-  
bris, prior ortum dicit a stimulo & fer-  
mento miasmatis pestilentialis, & finitur  
sudore, vel eruptione bubonum ac Car-  
bunculorum: altera febris est effectus  
prioris febris, inflammationis & suppu-  
rationis bubonum ac Carbunculorum,  
nec non residuae quantitatis virus pesti-  
lentialis, quæ vel solummodo in sanguine  
hæret, vel simul etiam inflammatio-

nes topicas; ut; capitis, pulmonum, ventriculi &c. causat. Succedit nonnunquam etiam pesti tertia febris, vera febris lenta.

Cæterum quoad typum febris pestis lentialis: plerumque est continua quotidiana, vel tertiana, rarissime typum intermittentis servat. a) dolendum tamen, quod in morbo tam præcipiti, tantisque symptomatibus malignis stipato semper febris ordo vix penitus observari possit.

2. Pestem esse summum gradum febrium omnium malignarum determinant duratio minor morbi, ut in aliis febribus malignis, vehementia major, lethalitas maxima

a) Chenot tractatus de peste p. 53. Mertens observ. Med. de febribus putridis, peste nonnullisque aliis morbis p. 102. Mackenzie in Philosoph. transact. 47. p. 384. ubi contendit sub initio morbi symptomata similia iis esse, quæ paroxismum febris tertianæ commitari solent & T. 54. p. 74. in progressu morbi vero semper versus versus peram exacerbari.

xima & contagium subtilissimum, quæ mala symptomata in nulla alia febre citius, frequentius, ac violentius, ut in peste occurunt. Tanta sæpius mali ferocia existit, ut intra tres, quatuor dies plurimos enecet; imo in peste, quæ 1718 in Transylvania urbem Coronensem cum suo districtu castigavit intra viginti quatuor horas enecatos fuisse ægros refert Cl. Albrich, & in peste Moscovitica 1771 Cel. Mertens, altera die Cel. Chenot in epidemia Coronensi anni 1756. a) Citius sæpe moriuntur Homines, quam Medicamenta vim aliquam exercere possunt. Vix unum in furore pestis Moscoviticæ ex viginti quinque peste correptis sanatum esse annotavit Cel. Mertens & suo tempore Sydenhamus. b)

2. Præprimis materia severæ indagationis digna est existentia Contagii, &

A 3

eius

a) Albrich in manuscript: Mertens. L. C. p.  
101. Chenot. L. C.

b) Sydenh. opera omnia I. C. de peste. Mer-  
tens L. C. p. 109.

ejus modi, a cuius cognitione vera salus vel interitus totarum regionum pendet. Id circo a longo jam tempore in utramque partem a doctis viris disputatum est, ita, ut aliqui omne contagium negarent, alii contra firmiter idem defenderent, diversos tamen modos contagii proponerent. Post multa circa hanc rem arduam instituta observata evidenter nunc patet existere in peste verum contagium in alios transferendum per hominem morbosum, vel sanum miasma pestiferum exhalantem, vel fomitem, cui sub tenuissimi halitus specie adhaeret. In partiali tantum atmosphæra horum corporum continetur contagium, & inde sub tenuissimi halitus specie per vasa cutis resorbentia, nares, salivam, cibos, inspirationem corpora humana intrat, & in dispositis pestem producit. Per liberam minime propagatus, nam si in atmosphæra universali hæreret morbi causa, omnes ejusdem regionis, saltem loci inco-

---

a) Contagium pestis negant Chicoineau, Soulier, Verny, & Pye.

læ cujuscunque conditionis indiscriminatim peste affici deberent, quod in pluribus morbis epidemicis accidere notum est; sed hoc non contingit, imo omnes, in eadem regione vel urbe viventes, si a communicatione qualicunque cum pestiferis personis vel rebus abstinent, a peste immunes remanent, quod remedium prophylacticum præter bonum vivendi genus, & fugam in pagos, nostris adhuc diebus peregrinis christianis in urbibus Turcicis habitantibus peste furentे unicūm esse solet.

Quæsitum porro est, quis ille fomes aptus sit pro recipiendo & propagando miasmate pestilentiali? non me errare credo, si contendam adesse tantum res porosas, & molles; ut vestes, lanam, telas lineas, præsertim saponem expertas, gossypium, cannabim, chartam, animallium plumas, pilos & pelles; quæ res rursus pro sua qualitate externa plus vel minus evadunt contagiosa. Ita gossypium, pelles, sericum, lana, panni intimius recipiunt, ac arctius fovent miasma,

quam cannabis, linum, tela linea, co-  
ria, papyrus. Eorum vis contagiosa acui-  
tur, si calefiant; calore enim miasma  
pestilentiale volatilius fit. Ideo res no-  
minatae facilius inficiunt hominem cor-  
pore sudante vel febricitante, quam hu-  
moribus temperatis existentem; ideo hye-  
me difficilius inficiunt, quam æstate; ideo  
homo peste laborans sudans alium citius  
inficit, quam si non sudaret; contagium  
pariter metuendum tantum a rebus, quæ  
magis in quotidiano usu fuere, non ve-  
ro a talibus, quæ solummodo in domi-  
cilio ægri asservabantur. De multis aliis  
inanis spargitur contagii metus, quam-  
vis non solum nonnullis antiquis, verum  
etiam recentioribus autoribus verosimile  
visum fit corpora etiam dura, ut ca-  
ralla, metalla, nummos, ova, panem,  
gummata, coffeam, triticum, poma,  
ligna, ceram, saccharum, mel, pisces sa-  
litos, nec non olea, fluidaque omnia  
pestis contagium recipere, & eo alios  
inficere valere. Sic inter alia nuperrima  
legitur in Collect. Berol. Tom. VI. Ob-  
servatio pestis communicatae per corallia

&amp;

& nummos aureos. At sedula obseruatorum attentio hanc contagiinimis magnam extensionem facile dilucidabit. Adhaerere quidem posse miasma pestilentiale levi superficie corporum durorum concedo, nihilominus tamen iis pestis propagari non potest, quia ab aere, & solis calore facile diffatatur, ideoque haec corpora purificantur. Et pone data occasione contagium ex certo loco infecto cum coralliiis, nummis, & ejusmodi corporibus duris in alium adductum fuisse; ergo ibi non sola existere corallia, adfuerunt etiam res molles, vel homines ipsi, qui contagium transportarunt, sicuti in epidemia transylvanica anni 1770 falso fama spargebatur pestem per sola corallia a Militibus in finibus Transylvaniæ ex domo infecta aufferta in aliquot pagos Siculicos esse translatam, ubi tamen etiam alias res molles abstulerant, coralliaque ipsa filo, & cingulo linteo annexa fuerant.

Existit vero quartus adhuc contagii modus, nempe per aerem, seu vehiculum

A 5

effluviis

effluviis contagiosis refertum. Contin-  
git hoc, si atmosphera ægri alium alluat,  
vel si in Domicilio aer inclusus & mul-  
tis exhalationibus pestiferorum inquina-  
tus fuerit; imo contendunt Sydenhamus,  
Swietenius, Mertens aliique fide digni  
autores a) a pestiferis multis insepultis  
aerem liberum pestiferum, eumque in  
viciniis locorum, ubi plura cadavera  
hominum peste mortuorum insepulta pu-  
trescunt absque fomite, vel personali  
consortio contagiosum fieri posse: sed aer  
contagium non procul defert, & quam-  
primum eidem libera Communicatio cum  
atmosphæra conceditur, hæc effuvia dis-  
persa & divisa virus suum perdunt. b)

4.

a) Sydenham t. imo.

Swietenius commentarii in Herman.

Boerhaave Tom. V.

Mertens pag. 114.

b) Ideo in urbe peste multata securi in viis  
& plateis ambulare posse conupertum est,  
& mihi narratum a fide dignis viris in aleis &

an-

4. *Epidemica* dicitur pestis, quia multos in eadem urbe vel regione quodam tempore invadit; nonnunquam in quibusdam locis adeo se extendit pestis, ita, ut paucæ familiæ ab ea liberæ maneant.

5. *Bubones* sunt tumores inflammatorii & suppuratorii locorum glandulosorum. Hinc oriuntur in inguine, sub axillis, pone aures, & sub maxillis, quorum frequentissimi inguinales, dein axillares, rarissimique pone aures. Prodeunt saepe sine ulla ægritudine ante ingref-

anterioribus ædium partibus, ipsis in domiciliis interioribus pestiferos continentium bene perflatis, nullum adesse contagii metum imo experientia multiplici edocti obsevatores contendunt absque noxa domos, ubi ægri jacebant ad distans intrare potuisse, dummodo novo aere domicilium renovatum fuerit, & ægrorū vel res infectas non tetigissent ipsis: ægrorum enim & rerum infectarum contactus, nec non exhalationes concentratae tantum inficiunt.

gressum morbi, interdum cum aliis symptomatibus, nonnunquam paulo post, & constituunt veram pestis crisin. In peste Coronensi anni 1718 erupere in nonnullis prima vel secunda die cum sudore tanta cum euphoria, ut quarto vel septimo die ægri surrexerint electo. Quam plurimum tamen secundo, vel tertio die prodeunt, raro quarto. Nonnulli, quod frequentissimum est in nominata epidemia unicum tantum habuere bubonem in inguine, vel sub axillis, alii in utraque parte inguinum vel axillarum, alii porro in uno eodemque inguine duos, alii deinde in toto corpore modo tres, modo quatuor, & rursus aliqui vel solos bubones vel anthracibus conjunctos, saepius quoque apparent bubones sub axillis & inguine ejusdem lateris, rarius in utraque inguine, & rarissime in utraque axilla. Annotante Cel. Mertens (L. C. p. 104) proditurum fore bubonem indicant glandulæ cujusdam dolor & tumor, qui tandem vario modo crescit a magnitudine pisii, usque ad pugni volumen.

Bubo pestilentialis exortus jam vel abit in gangrænam , vel transit in suppurationem , qui frequentissimus morbi exitus salutaris , raro septimo nonoque die plerumque ad 14 — 20 diem continet , vel quod ratius , mutatur in Scyrhum , quem in se ipso expertus est Chenot. a) vel Discutitur subsecente ac concomitante largissimo sudore , b) aut alvo vel urina purulenta absque noxa , cum ægri levamine. Nonnunquam cum damno regurgitat ad alias diversas partes bubo discussus : in talibus plerumque successere ophtalmiæ , tumores colli , peripneumoniæ , phrenes , Carus , convulsiones , prout nempe retrogressa materies hanc illamve partem occupaverit , petechiæ & mors. c) Interdum bubo ex uno .

- a) Chenot L. C. pag. 16. Mertens Loco cit. pag. 139.
- b) Dauer in relatione de peste Aleppensi , quæ excussa in philos. transact. vol. 53. p. 39. Albrich L. C. Sudorem illam frequenter in statu ac decremento apud ægros Cel. Dauer vidit.
- c) Albrich L. C. chenot. p. 78.

uno loco in alium migravit in Epidemia Coronensi anni 1718, ut ex inguine in axillas saepe tertio — septimo, imo decimo quarto die: quod vero malum erat.

6. Carbunculi sunt furunculi maligni celerrime in gangrenam abeuntes. a)

Prægressa febre nunc majore, nunc minore plerumque die secundo, tertio, vel quarto conspicuntur in omnibus partibus musculosis. Ut plurimum tamen truncum & artus infestant, rarissime extremum pedem vel manum. Visi sunt in Epidemia Coronensi anni 1718 in vertice capitis, super musculum temporalem, in facie, cervice, collo, thorace, super scrobiculum cordis, sub umbilico, in infimo ventre, super scapulas, in lumbis, clunibus, labiis vulvæ, extremitatibus ac digitis extremis, ut & interne in collo vesicæ urinariæ, imo in bubonibus ipsis, quod annotavit etiam cel. chenot &

Mer-

---

c) Richters Aufangsgelinde der Wundarzneykunst. T. I. p. 137.

*Mertens.* Præter loca memorata in mamma & lingua; prope tendinem Achillis, sub poplitibus & capillata capitis parte eosdem observavit cel. chenot (L. C. p. 83.) Sunt vero carbunculi vel soli vel cum bubonibus vel petechiis juncti. Nunquam tamen citius bubonibus, sed semper serius prodeunt, nonnunquam etiam absque bubonibus. a) Ut plurimum tempestate fervida Junio, Julio, & Augusto animadvertuntur, rariores sunt autumno vergente, Hyeme, & initio veris, sparsim tamen hic illic videntur. b)

Ratione numeri carbunculi in eodem subiecto sunt modo unus, modo plures, in Epidemia Coronensi anni 1718. in sudore apparebant septem, in vetula quindecim, in infante viginti quatuor. Chenot numeravit in ægro duodecim. Nymia tamen bubonum & carbunculorum copia suspicta semper est, constat enim ob inflammationem, dolorem & ardorem in-

a) Mertens Loc. C. 106.

b) Chenot. L. C. p. 83.

intolerabilem aliquos ex febre symptomatica adhuc interiisse.

An pariter Carbunculi vere critici, uti bubones dici possint, res altioris quæstionis est. Negant id Sydenhamus-Schreiber & Mertens. a) Contendendo carbunculos & petechias mere symptoma esse denotantia solutionem Humorum putridissimam, maximamque acrimoniā, hinc quo frequentius bubones, & rarius carbunculi accedunt, eo mitios pestis est, & periculosior, quo plures vel majores adsunt carbunculi.

Celerrime transeunt in gangrenam, tuncque pars mortua separatur, ut plurimum nono vel decimo quarto die a carne fana. Manet dein ulcus pro diversa ratione corporis diversum in hoc facilius in illo difficilius sanandum. Notus mihi casus est in cuprario ex Epidemia

---

a) Sydenham L. C. Schreiber observata & cogitata de peste p. 41. Mertens L. C. p. 110.

mia coronensi anni 1756, in quo remansit  
fistula æterna.

§- 3.

Verum enimvero non omnimodo con-  
stantes in omni peste sunt recensiti hi no-  
tionis characteres, neque ex ipsis for-  
mari definitio logica potest: contraria enim  
interdum quædam de hoc vel illo pestis  
charactere in hoc vel altero subiecto pro-  
ferri possunt, quæ inconstantia occasio-  
nem sæpius medicis dedit ad summas  
dimmicationes & discrepantias, an præ-  
sens morbus vera pestis sit vel tantum  
febris maligna? enarrabo itaque ea sin-  
cere, quæ experientia de ea docuit.

i. Non defuere autores magni certe  
nominis, qui *absque omni febre pestes sta-*  
*tuerunt.* Sufficit ex iis proferre *Rivinum,*  
*Diemerbroeckium, & chicoinau.* a)

Horum

---

a) *Rivinus de peste Lipsiensi 1680. Diom. r-*  
*broek de peste Neomagensi 1637. Cnicoi-*  
*nau*

Horum virorum de peste optime meritorum assertum quod naturalem inter tum invenerint pulsum in dubium plane non vocabo: sed ex pulsu tardiori quomodo concludi potest nullam adesse febrem? cum saepe in febribus putridis malignis etiam pulsus naturalis, imo naturali tardior adsit; an quis hoc praesente pulsu in febribus putridis nomen febris ipso jure eis quoque denegabit? adde propositiones, an recensiti autores omni ab initio morbi die aliquoties pulsum maxime variantem recte exploraverint, & annon ex unica exploratione ad totum morbi decursu extensionem fecerint, dum pulsus e contrario in initio celer erat, dein vero debilis factus fuerit? tertio ipse *Sydenhamus* a) qui pestes absque febre etiam statuit, suscipit in talibus ægris rigorem ac horrorem leviusculum præcedisse, quomodo ergo vir expertissimus sibi contradicere, & pestes absque

que

nau relation de la peste de Marseille-

1720.

a) *Sydenham opera omnia R. I. pag. 65-*

que febre contendere potest, cum rigor febris sit initium? denique considerari debet, cum omnis bubo sit morbi crisis, an crisis absque minimâ saltem perturbatione pulsus, adeoque febre in benigna etiam peste contingere possit? manet igitur sententia illæsa, in omni peste adesse febrem, in hac magnam, in illa minorem, inque alia levissimam ab ægro fere non perceptibilem.

2. Non semper adeo *lethalem* esse pestem, uti præcedenti paragrapho annotavi experientia multiplici compertum est; nonnunquam enim, præsertim declinante morbo, nec non tempestate Hyemali frigida pauci afficiuntur, & pauci moriuntur, vel pauciores seriusque, ut in nonnullis malignis putridis interdum accidisse notum est.

3. Cel. Mackenzie sæpius eo tempore, ex quo ipse in Oriente coimmoratus est, nempe per viginti quatuor annos, tam sporadice quam epidemice grassatam esse pestem Constantinopoli, Smyrnæ &cæt.

B 2 typis

typis evulgavit. Ideo contendit etiam pestem in Europa vehementius grassari, quam in Turcia. o)

4 Absque contagio seu ex causa interna sensim evoluta pestem quoque oriri præsertim in Dominio Turcico, res est, quæ nulla demonstratione eget.

5. Moriuntur sæpe ægri absque *bubonibus* & *carbunculis*, solummodo cum vel absque etiam *petechiis*, id quod in maximo gradu pestis contingit, ubi nempe vires naturæ a virulentia pestilentiali plane oppressæ reagere nil possunt, adeoque miasma nulla ratione expellere, & ita succumbere debent. b) Sciendum tamen etiam est, dari bubones extra pestem in aliis febribus malignis, Lue ve-

ne-

a) Mackenzie in Philos. transact. T. 47. p. 384.

b) Russel de peste Aleppensi, Chenot. L. C. Rosenstein tal om pesten p. 6. Mertens L. C. pag. 109. & 132.

nerea, Scorbuto. a) Non minus carbunculi occurrunt in putridis. b) Hinc bubo & carbunculus cum febre sola non constituant pestem. Sic etiam parolides in morbillis & scarlatina saepe ipse vidi presente febre nunc majore nunc minore.

## §. 4.

Cum itaque constantes in omni peste characteres enumerati non sint, & singuli etiam in aliis morbis inveniantur, ergo officium prudentis Medici erit data

B 3

oc-

a) Chenot L. C. pag. Poppelbaum dissert: de febre maligna Götting. 1743. Zimmermann Von der Erfahrung. T. 2. Grant. Beobachtungen über die ansteckende fauliche Fieber. p. 13.

b) Sauvages Nosologia. T. I. p. 417, uti & Grant Beobachtungen über die Fieber. p. 528. memorabilem casum narrat febris malignæ cum carbunculis.

occasione ex symptomatibus collective sumptis pestis definitionem componere. Præ aliis vero optimum indicium ejus exhibent bubones & carbunculi cum summo infectionis gradu eorum cum quibus commercium est.

## §. 5.

*De causa pestis proxima seu miasmate pestilentiali.*

Proximum est, ut inquiram, quidquid sit, quod pestem producat, ubi hoc contingat, & quomodo? producit pestem miasma pestilentiale, miasma specificum uti variolosum, subtilissimum & deterrium omnium miasmatum in rerum natura existentium, natales suos ubique locorum habens; modo in aliqua urbe magna populosa concurrent causæ ejus communes. Falsa igitur sententia quam plurimorum autorum est, qua ejus patriam solummodo in Ægypto vel Æthiopia, vel alibi querere & inde semper solo contagio mediante fomite in nostras


re-

regiones perducere voluere. Confirmant idem pestes in Europa absque contagio enatæ, quæ potissimum fuscitantur, si copiosæ urbes diu maxima annonæ penuria, longisque obsidionibus gravibus premantur, præsertim si accedat aër humidus calidus. Quoniam vero tantæ calamitates in Europa rarissime contingunt, ut plurimum in Europa pestes oriuntur ex fomite infecto ad nos translato ex regionibus Dominii Turcici, in quo quotannis omnes causæ pestis concurrunt. Nec in Dominio Turcico unica sola urbs dici patria pestis potest. In omni copiosa eiusdem urbe ut Constantinopoli, Smyrnæ, Adrianopoli, Alexandriæ &c. semper adest abundans causa, & pabulum mali, & ibi ex proprio seminio interno evolvi solet, pro diversitate locorum tantum hic vel illic sævier vel leviior occurrens. a) Ita cæteris paribus sævius grassatur pestis in Alexandria in

B 4

Ægypt-

a) Ideo rarior & mitior est pestis in pagis Turciæ, præsertim in illis qui parum commercii cum aliis habent.



Ægypto, quia hæc urbs magna præter causas memorandas multis paludibus circumcincta simul est, adeoque pestis virulentis exhalationibus eorum putridis multum ibi exaltatur; quamobrem nonnulli Alexandriam pestis patriam appellarunt. Endemia hinc in terris Turcicis esse solet pestis, præsertim ob triste fatum Mahomedanum.

His præmissis iure statui potest pestem dupli via oriri, nempe 1. ex causa interna sensim evoluta, uti vulgo in Turcia & nonnunquam apud nos in longis obsidionibus contingit, vel 2. contagio, ubi nempe hoc venenum varia supra indicata ratione ad alios translatum humoribus corporis humani communicatum fermentativo modo febrem incendit, & ita singula pestis symptomata producit.

Quid iam in Dominio Turcico ansam det generandi miasmatis pestilentialis, an ex inundationibus Nili in Ægypto producatur, & solum inde in alias regiones Turcicas contagio propagetur, vel aliunde? a longo tempore ab

au-

autoribus quæsitum est. Multas sufficien-  
tes ego habeo rationes, ut ponam ejus  
causam in humorum corruptela exorta  
ex miserrimo vitæ genere inter plebejos,  
penuria multa, fame, cibis cacochymicis,  
& immundicie, accedente climate cali-  
lido regionum orientalium. Consentient  
mecum observatores, qui in Turcia ad  
eruendas eius ortus rationes omnem na-  
varunt operam. Inter alias memorabi-  
les observationes de pestis ortu mihi  
quoque communicavit optimus meus ami-  
cus Borussus natu Cel. Renzing quondam  
Archiater Principis Tartariæ, qui per  
multos annos in terris Turcicis Constan-  
tinopoli, Ægypto, Alexandriæ, Smyrnæ & cæt. medicinam exercuit.  
Observavit ipse plebejos in toto terra-  
rum orbe ob esculentorum caritatem, in-  
gentem eorum paupertatem, & egeno-  
rum a die in diem misere victum quæren-  
tium copiam nullibi tam misere vivere  
quamin Turcia, & inter alia Constantino-  
poli. Solent, ait ipse porro, multi pau-  
perimorum in societate in conclavibus  
angustis profundis cellisque humidis ha-

bitare, adeoque exhalationes proprias putridas imbibere rursus, stramine putrefcente cumbere, & olivis saepe semi-putridis, cepa, ovis piscium rancidis (Caviar ibi dictis) piscis salitis, oleo copioso & pane aquoso acido non satis cocto nutriti. a) Domicilia interna Turciæ incolarum a nimis frequenti usu balneorum sunt semper humida; ignem solis carbonibus absque fornacibus parant, neque frigeant, solent multi nocte vas a carbonibus accensis repleta supponere stragulis, eorumque fumum calidum inhalare, accedit, quod Constantinopoli ædes sint altæ, & plateæ augustæ; stagnare ergo aer exhalationibus variis repletus in domiciliis semper debet, quia vento non dispelli potest, accedunt in Ægypto exhalationes putridæ effusi Nili, in aliis vero provinciis maris, aerisque frequentes mutationes. Multum quoque damni parere debet Constantinopoli portus juxta urbem situs, in quem omnia ca-

da-

---

a) Græci et Armenæ potissimum amant ova pescium, Cepam, olea.

davera sanguinem animalium mortatorum aliaque fætida iniiciunt urbis incolæ, quæ ibi putrescunt & sæpe tempestate placida ventis carente magnam urbis partem vehementissimo fætore implent quia a nimis parvo rivulo in portum influente non satis renovatur portus: adeoque aqua heterogeneis rebus grava stagnat ibidem & putrida fit.

Accedit, quod aqua omnis potulenta valde vappida, & mala Constantinopoli sit. Hinc Constantinopolis aliæque urbes præsertim autumno, Hyeme & vere crassis nebulis mane & vespere obteguntur. Ex his ennarratis natam humorum corruptionem eo magis promovere debet omissio usus vini, quod Turcæ ex lege, & Græci plurimi ex avaritia & inopia non bibunt, nec non ieunia anniversaria Turcarum ex lege per tempus lunare observanda, ubi ab oriente usque ad occasum solis plane nil oriingerunt.

Materia itaque, ex qua in Turcia præparatur miasma pestilentiale potissimum humorum corruptionem involvere videtur, quia ex causis oritur, quæ humorum degenerationem efficiunt, quia miasma pestilentiale jam existens a causis putredinem producentibus exaltatur, & quia phænomena in peste occurrentia quam plurimum sanguinis dissolucionem indicant, inde plurimæ pestes sunt plus, minus putridæ indolis, ideo in Turcia etiam pestis potissimum inter plebejos grassatur, rarius divitem agreditur. a)

His rite inter se perpensis miasma pestilentiale definiri potest, quod sit tenuissimum alcali sanguinis naturalem Crasin

a) Multum quoque favet huic theoriæ autor in libello, qui Yverduni 1779. prodiit sub titulo, della peste di Constantinopoli del 1778 osservazioni sulla medesima e riflessioni del autore, et optimus meus amicus Cel. Ferro. Von der Ansteckung der epidemischen Krankheit und besonders der Pest 1782. Leipzig.

sin dissolvens & destruens eumque ad phlogosēs & gangrēnas pessimas efficiendas disponens. Potissimum vero in systema nervosum vim suam exercere videntur; a) demonstrant idem phænomena in peste occurentia, qualia sunt: subita vi-  
rium prostratio, pulsus sine insigni cele-  
ritate, imbecillitas, vertigo, temulentia,  
dolor, anxietates, vomitus materiæ  
æruginosæ, deliria, stupor, palpitati-  
nes cordis, animi deliquia tremor, urinæ  
pallor aliaque copiosa symptomata  
nervosa, quæ certe corruptioni humorum  
non contribues, potius labefactato in-  
fluxui spirituum vitalium, in primo enim  
saltem impetu nulla humorum corrup-  
tio proditur, imo adest in nonnullis in-  
flammatoria sanguinis viscositas.

Hoc miasma jam in corpus illatum  
in nonnullis prima adhuc die, in aliis  
serius pestem producit secundum diver-  
sam

a) *Mead de peste, chicoinau L. C. p. 75  
Pringle. Von den Krankheiten einer Armee  
p. 377. Chenot. L. C. p. 42.*

sam suam volatilitatem, copiam & malignitatem & imprimis corporis dispositionem, non ultra septem vero dies delituisse in corpore humano experientia suffultus refert Cel. *Chenot* a) hinc tempus, per quod secludantur homines in finibus Dominio Turcici ad 15 - 20 dies restringi posse concludit Cel. *Rosenstein* Abbrevianda ergo nimis longa quarantæna, quæ nostris regionibus plus detrimenti hucusque commercio fracto attulit, quam ipsa pestis. b)

Virus pestilentiale, uti filum variolosum activum manet per longum tempus.

a) *Chenot* L. C. p. 204. *Rosenstein* L. C. p. 16.

b) Quapropter non satis laudibus efferre possum optimi nostri principis *Josephi Secundi* nova circa quarantænam in finibus nostris continuo adornatam anno 1782. publici juris facta Instituta; secundum quæ hominibus ex regionibus ipsis Turcicis ad nos

pus. Apud Cel. Chenot. Purificationis Minister Cistam, quæ suppellestilem ex fa-

nos advenientibus per septem dies in finibus pro purificatione morandum fuit, ex Walachia & Moldavia vero peregrinantibus sine mora via libera in nostrum territorium pavuit exceptis mercibus, quæ per consuetum tempus ibi asservabantur. Tota Transylvania hujus cæsarei mandati publicationis diem pro initio futuræ salutis & adipiscendarum divitiarum, commercio nunc libero facto, jubilans salutavit. Nec video ego cur ultra 7 ad 10 dies homines ex dominio Turcico advolantes in Quarantæna 40 dierum asservari debeant, quum constet 1mo. Non semper pestem ex domino Turcico ad nos venire, 2do ipsam pestem in Valachia & Moldavia nobis vicina quicque ita raram esse uti in Transylvania; presentem vero ibi pestem semper ad nos pariter propagari, quamvis per 6 septimanas homines in finibus Transylvanii includantur: vidi enim ipse saepè, vidit Chenot, viderunt & multi alii plenariam purificationem rerum infectarum im-



familia peste extinta residuam aliquot  
menses recondiderat, horis antemeridianis  
ape-

impossibilem esse: ergo favente aere, aliis  
que causis prædisponentibus per ipsam qua-  
rantænam pestis in nostras terras introduci  
potest. Adde quod paupertas de die in  
diem in Transylvania crescens nostras inco-  
las in regiones Turcicas commercii causa  
peregrinari cieat; multi vero pauperrimo-  
rum quartænam adeo longam servare non  
possunt, plus enim ibi consumerent quam  
itinere naati sunt; ideo per tramites oc-  
cultas cum mercibus in Transylvaniam in-  
trare coacti sunt, si vivere volunt. Qua-  
rantæna itaque longior pestem non plus a  
finibus nostris arcet breviori; imo proba-  
tis præmissis contendere possum, quod tan-  
tum furente peste progressum ejus cele-  
rio em impeditat; quia maxima hominum  
pars presertim opulentiorum quartænam  
servat, & regiones nostras depauperat. Est  
enim Quartæna continua optimum auxi-  
lium pro divitandis solis mercatoribus in  
societate mercantibus, quibus opifex pau-  
per impensa & tempus longæ quartænae  
timens

aperiens in pestem incidit, Cl. Stocker  
apud Cel. Chenot Budæ integre post luem  
extinctam anno nempe 1714 eandem re-  
fuscatam esse hac occasione refert: Mu-  
ra-

---

timens merces pretio ipsis lubenti dare  
coactus est.

Ex omnibus his præmissis demonstrante id quo-  
tidiana experientia liquet res impestatas  
nunquam inficere, nisi causæ externæ, aeris  
nempe mala constitutio, fames, ac pecu-  
liaris corporum dispositio simul adsint. Alias  
enim Transylvania, alias Hungaria continuo  
a peste devoraretur plena nimirum semper  
rebus ex Turcia clam allatis, etiam ex ur-  
bibus peste infectis. Ad quid ergo longa  
quarantæna? si enim causæ externæ in Regio-  
ne adsint vel minima fames mox pestem  
excitabit nulla mora servata, cuius introi-  
tum nec vigiliæ denegabunt quidem; si ve-  
ro causæ externæ nullæ adsint qualiscumque  
innocens manebit, uti id quotidiana nos  
docet observatio: addé quod Turcæ omnes fe-  
bres acutas pestis nomine appellant & vi-  
cinas regiones falso rumore terrefaciant,



rarius bubonem suppurantem gerens lin-  
teum pure madidum in muro propriæ  
domus recondiderat, adactoque ligneo  
cuneo foramen obturaverat; post anni  
spatium, dum suam domum dealbaret,  
a vana simul & funesta motus curiosi-  
tate cuneum extraxit, paulo post obiit  
totamque ejus familiam pestis indubiis  
signata indiciis successive absumpsit sine  
ulteriori sequela. Nec non Cel. Erndtel  
casum adducit: ubi uxor aurigæ culci-  
tras abstulit, quibus ante annum peste  
mortui incubuerant, & peste correpta est.  
a) statuendum vero idem est tunc tan-  
tum, quando miasma pestilentiale inclu-  
sum, & ab omni aeris aditu orbatum  
fuerit. Accedente vero aere libero pu-  
rificantur hæ res, vimque inficiendi amit-  
tunt. Hinc illæ tantum merces infectæ

ex

---

hinc nuncia de peste ex Valachia & Tur-  
cia ut plurimum falsa sunt præfertim dum  
ea semper a mercatoribus afferantur qui  
nullam morbi notitiam habent, boni enim  
hisce in locis medici vel nulli vel certo  
rarissimi sunt.

a) Erndtel Varsavia physice illustrata p. 171.

ex Turcia ad nos allatæ nobis erunt contagiosæ, quæ bene fuerunt obtectæ, clausæ, vel quæ infectis pro usu quotidiano inservierunt.

*Peste in epidemia coronensi 1718* bis terve aliqui corripiebantur: *Diemerbroeck* & *Russel* a) variis observationibus cognoverunt eundem morbum aliquoties ægros invasisse; *Mackenzie* b) plures vidit, qui peste aliquoties tentati fuere & græcum quendam, qui nosocomii cuiusdam curam habebat decima quarta vice peste laborare & tandem ea mori. Famulus *Chenoti* c) ter pestem expertus est. Eademque epidemia peste mortuus est vir 35 annorum intra triduum, qui 1738 feliciter pestem superaverat. Et

C 2

Cel.

a) *Diemerbroeck L. C. Russel the natural history of Aleppo* p. 225.

b) *Mackenzie philosoph transact. P. L. IV.* p. 69.

c) *Chenot L. C. 49-50.*

Cel. *Mertens* narrat . quod in epidemia moscovitica anni 1771 medicus cum chirurgis peste aliquoties tentatus, sudoribus criticis cito ab ea sit liberatus a). Ex his recensisitis satis superque patet scopo prophylactico inoculationem a cl. *Wespremi* nuper rursus propositam nil juvare , imo periculosam esse b).

Magnam intercedere cognationem inter pestem & variolas jam cognovit *Verny*, *Schreiber* & *Mertens* c). Utriusque enim morbi causa est miasma specificum contagio propagandum , uterque morbus orditur dolore capitis , Dorsi, abdominis, lamborum , vomitu ; singulis prodeunt proprii tumores , in peste bubones , in variolis pustulæ peculiaris & determinatæ

a) *Mertens* L. C. p. 94.

b) *Wespremi* tentamen de peste inocculanda.  
London. 1755,

c) *Verny* Dr. de la peste p. 286. *Schreiber*  
L. C. p. 45. *Mertens* L. C.

natæ formæ, quibus egressis remittunt priora symptomata, & si bona suppuration succedit ex utroque morbo ægri evadunt; dein solemnes utrique morbo sunt petechiæ, uno tempore minus, alio plus inficiunt, imo nonnullos plane non tangunt, eademque ratione curantur bini morbi. Junctis his affinitatibus tamen differentia quædam intercedit inter pestem & variolas. Variolis nempe homo plus semel non corripitur, peste saepius, nec adeo periculose sunt, uti pestis, febrisquæ in variolis plerumque intensior est, quam in peste; præterea variolæ in Europa sunt Endemicæ, certis annis regnant, plus infantes inficiunt: pestis vero apud nos plerumque ex Turcia translatitia, indeterminato tempore oritur & sine discrimine omnes aggreditur. Denique variolæ plurimæ sunt inflammatoriae naturæ, pestes putridæ.

## §. 6.

*De causis pestis remotis, nempe contagio,  
dispositione corporis & aere.*

Ut jam miasma pestilentiale corpus  
humanum inficere valeat peste, concur-  
rere debet :

I. Contagium a) & præprimis :

2. *Prædisponens in corpore humano  
causa ad assumendum, & assimilandum  
miasma pestilentiale cum humoribus no-  
stris & ad producendum morbum con-  
tagiosum, seu ut Sydenhamus a) loqui  
amat;*

a) Quia apud nos utplurimum pestis con-  
tagio excitatur & propagatur, hinc in  
hocce libello semper de peste ita agam,  
quatenus ex contagio ortum habet, reli-  
qua, quæ pestem ex sola causa interna  
natam concernunt, facile inde erui possunt.

b) *Sydenh. L. C. p. 64. Swietcn t. v. p. 152.  
in Comment.*

amat: peste corripiendus humores habere debet paratos ad afflatum excipendum refertos. Ideo non omnis homo versans inter infectionis causas afficitur peste. Sunt annotante Cel. Chenot L. C. p. 34. aliisque autoribus, qui diu noctuque inter pestiferos versantur, & profecto miasmate inquinantur, ab hoc morbo interdum per hebdomadas & menses immunes. Videtur in talibus hominibus causa prædisponente carentibus hoc miasma in corpore humano sine ullo, aut saltem perceptibili sanitatis detriumento aliquamdiu delitescere posse, cum humoribus innocue circumduci & per transpirationem insensibilem educi sensim, alios enim dispositos hi inficere possunt peste.

Horum assertorum multa sparsim in observatoribus exempla legi possunt. Ita Chicoinau (L. C.) absque noxa pestifero sedet ad lectum; apud Schreiber (L. C. p. 8.) mulier marito lue pestis contaminato in eodem lecto per omnem morbi decursum impune adcepuit: imo

filia ejus cum carbone die morbi quinto obiens maniacā matrem momordit ad pectus, vulnus sanabatur, & mater mansit sana. Cel. Mertens (L. C. p. 121.) Adfert casum, ubi mulier cum octo liberis & duabus fæminis in unico domicilio habitavit, omnes, ea & puero sex mensium exceptis, moriebantur, & per 48 horas infsepultæ in domo manebant, mansit mulier in ea domo, osculata est mortuos, & tamen peste infecta non est. Ab aliis hominibus patet, eos peste necatorum vestes absque noxa induisse; quales casus mihi noti sunt ex epidemia transylvanica anni 1770.

Cel. Dauer a) historiam narrat, ubi nutrix infantis quinque mensium peste correpta usque ad mortem fere infanti proprio ubera præbuit, qui tamen ipse contagio affectus non est. Idem quid nos observavit

a) Dauer philos. transact, vol. 53. p. 39.  
Schreiber L. C. p. 10.

vavit Cl. Albrich in epidemia Coronensi anni 1718. Imo tunc vicissim infans fugens peste corripiebatur, & evasit, mater vero sana mansit. Varia etiam exempla Cl. Dauer puerperarum innotuere, quæ fætus peste correptos in lucem ediderunt, licet matres ipsæ ab hoc morbo liberæ essent.

Diversa vero rursus hæc corporis dispositio pro singulari corporis constitutione manet: in uno subjecto major, in altero minor est. Ideo iste citius, tardius, levius, gravius aliis inficitur & necatur. Hinc in disposito cito leve contagium magnum fermentum febrem & mortem promovebit; non dispositus a majori non afficietur, uti scintilla facilime magnum excitabit incendium, si corpori inflammabili applicata fuerit, e contra vel exinguitur, vel difficiliter tardiusque ignem excitabit, si minus, vel plane non phlogisticam rem tetigerit. Egregie pro demonstratione horum, quæ protuli inservire poterit memorabilis casus mihi

hi a Cl. Renzing communicatus : cum interpres quondam in aula Turcica Græcus nomine *Carafa*, qui jam bis peste laboraverat, data occasione Constanti-nopoli adiisset primum Cæsaris officia-lem & ex singulari indulgentia Turcæ ipsi ad latus sedisset, videns mærorem Turcæ interrogavit eum de causa, re-spondit Turca, quod ante brevissimum tempus filia dilectissima in gremio suo peste obiisset. Timidus græcus ad hoc responsum valde perterrefactus studuit brevi discedere, domum festinavit & domi reversus statim dejecit a suo cor-pore vestes externas, famuloque suo de-dit ad manus. Nihilominus sanus man-sit interpres græcus, hic servus vero brevi peste correptus periit. Apud Che-not (L. C. p. 40) quoque senex sep-tuagenarius e fenestra domus infectæ pa-nem accepit, & pestem: qua die ter-tio mortuus est.

Multum sane interest, accurate sci-re, in quo hæc corporis dæpositio con-sistat?

sistat? Contenderc ausim in corruptione humorum, plerumque ex alimentis pravis & aere calido solo, vel calido humido generatam, id quod supra de peste Turcica ostendi. Hoc saltem ab epidemias in transylvania annotatis patet: in plurimis pestem non tantum anteisse, verum etiam commitasse magnam esculentorum caritatem, & annonæ penuriam potissimum inter plebejos cum sole multum fervent. Ideo explicare poteris, quare pauci divitum & plures pauperes peste corripiantur, & necentur.

Non parum quoque contribuet *aeris massæ occulta quædam crafis*, seu textura, ut corpus facilius contagium suscipiat diversis temporibus. Unde pestis quandoque lento passu procedit, alio tempore furore maximo regiones devastat, & sub aliis circumstantiis silet, vel omnino evanescit. Occultum auctoribus est, in quo consistat hæc aeris crafis, quam plurimum enim tempestas tempore pestilentiali sanissima fuit absque mor-

morbis epidemicis aliis <sup>a)</sup>). Plerumque tamen antecedit vel concurrit cum peste aer fervidus siccus vel calidus humidus.

Epidemica aeris constitutio pro diversa sua indole contagii vim & efficaciam multum intendere & infringere, imo plane penitus delere absque ulla hominum prudentia & industria potest ; neque unquam hujus morbi daretur finis, si anni vicissitudines aeris mutaciones in ejus virus nil imperii exercent. Profecto nisi aer adeo potens esset in propaganda, minuenda, imo delenda peste ipsa omni fere anno vel saltem temporibus epidemicis in Turcia urgentioribus peste obrui deberent nostræ regiones Turcicis vicinæ, ob continuum per

<sup>a)</sup> *Albrich L. C. Chenot L. C. Mertens L. C.* Apparuit etiam nonnullis observatoriis plures homines peste correptos esse tempore novilunii, aliis tempore plenilunii.

per tramites occultos cum Turcis commercium, quod tamen non semper, immo rarius succedit, uti ex præfatione patet. frigus enervat, calor, nec non aer putridus præsertim nebulosus calidus humidus auget miasma pestilentiale; hinc crescente anno pestis invalescit, ut circa autumnale æquinoctium acme attingat, dein collabescit, & brumali frigore evanescit a). Surgente inquam anno

a) *Sydenham L. C.* p. 63. *Hodges de peste londinensi.* Negare ausus est hoc *Sydenhami* commentum Cel. *Mackenzie* contendo pestem in Turcia ad Junium usque increscere, Julio & Augusto ex parte mitescere, mense Septembri & Octobri vix observari, adeoque quod tempes- ries aeris calida progressum pestis infringat, licet enim in principio æstus accidentis increscere videatur, post paucos tamen dies remittat. Supra laudatus *Renzing* propria experientia sufful- tus *Mackenzie* observata negat, laudat *Sydenhamum* & confirmat ejus observatio- nes

anno seu inter ver & æstatem exoritur, rarior alia tempestate ingreditur, aut tamen non multum debacchatur.

## §. 7.

*Divisio pestis.*

Dicitur pestis benigna & maligna, epidemica, sponadica, endemia, translatitia, solitaria & complicata. Solitaria plerūmque est, raro complicatur cum aliis morbis epidemicis ut febribus  
ca hta-

nes propriis in Turcia factis. Contendit ipse quoque pestem multiplicari æstate progrediente, & minui frigore accedente. Quia æstate transpiratio major, adeoque resorptio miasmatis pestilentialis facilior, dein quia corpus æstu augente ad humorum dissolutionem pronius sit, pestis adeoque minora impedimenta majoremque dispositionem pro assimilazione & fermentatione sui miasmatis in corpore humano inveniat. Concedit tamen clarissi-

mus

catharralibus, malignis, lentis & Hecticis, pleuritidibus, peripneumoniis, purpura, variolis, morbillis, lue venerea, erysipelate, angina, cephalalgia, dysenteria, scorbuto, gonorrhæa, quartana & cæt. divitir etiam a nonnllis a symptomatibus concurrentibus nempe in pestem cum bubonibus & in illam cum carbunculis vel utrisque,

## §. 8.

mus amicus pestem nonnunquam æstate calidissima mitiorem fuisse autumno, hyeme, vel vere, quia pestis ibi eundem typum servat, uti variolæ ac febres putridæ epidemicæ apud nos, quæ non semper (uti deberent ex principiis) æstate fervente sunt periculosissimæ, verum nonnunquam pro diversa aeris constitutione epidemica copiosiores & periculosiores Hyeme, autumno & vere. Si nempe tempestas typum suum naturalem non servat, sed æstatis formam induit idem patet ex decursu epidemicæ a Cel. Schreiber annotatæ L. C. pag. 75.

## §. 8.

*Decursus pestis in genere.*

Pestis non solum in variis regionibus, sed & in una, eademque regione, diversis temporibus & pro diversa miasmatis pestilentialis, qualitate, ægrorum constitutione morborum complicatione & pro suo initio, progressu, ac fine diversa ostendit symptomata. Interdum eadem manet pestis species, quæ fuit in initio. Interdum nunc in aliam mutatur e. g. inflammatoria in putridam vel putridam nervosam. Quandoque sub larva aliorum morborum incipit, ut pleuritidis, catharri, anginæ. Hinc præmittam generalem pestis historiam speciali. Prodromi communiaque pestis symptomata sunt: insolita corporis inertia, gravitas, torpor, lassitudo, aspectus tristis, inedia, lumborum molestia, capitis gravedo, hebetudo, obtusus dolor, vagi cutis succussus, phlogoses, somnolentia, febris typum intermittentis vel continuæ servans. Postque aliquot ho-

ras

ras vel diem unum alterumve pruritus & dolores in locis, ubi bubones & carbunculi erupturi sunt. Nominatorum horum symptomatum plura vel pauciora, leviora vel graviora in hoc vel illo ægro observantur. Nonnulli enim tam leviter ægrotant, ut hunc morbum vix pro morbo habeant; adeo levis & brevis horripilatio, calor fere naturalis succedens, pulsus robore & velocitate ad naturalem accedens, lassitudo exigua, capitis gravitas, ac dolor mitis, mentis non magna hebetudo, sitis vix ulla; quibus accedit secundo - tertio die bubo vel sudor, interdum totam materiam morbificam circa quartum diem dissipat, ut plurimum tamen circa septimum diem totus morbus cedit.

In graviori morbo sunt irregulares frigoris & caloris insultus, insignis præcordiorum anxietas tam ante, quam post eruptionem materiæ malignæ semper præsens, nausea, cardialgia, vomituritiones, imo materiæ biliosæ vomitus ipsi, dolores capitis, dorsi, lumborum, & artuum,

D som-

somnus & appetitus deletus, summus  
mæror pusillanimitas sine causa aperta,  
insensibilitas, stupiditas, subita virium  
prostratio, deliria, animi deliquia, car-  
bunculi & bubones copiosiores; ferox &  
turbidus vultus, oculi rubri, errantes,  
scintillantes; loquella præceps. Pulsus  
insigniter varians plerumque celer, debi-  
lis, interdum naturalis, lingua valde sic-  
ca, lutea & quasi pellicea, faucium dolor,  
cutis sicca.

Acutissima pestis est, ubi horror diu  
& valde perseverat, quem nullus mag-  
nus calor sequitur, pulsus inæqualis de-  
bilis celer fere vacuis, vertigo, temu-  
lentia, vomitus, materiæ æruginosæ,  
tremor, balbuties sudores utplurimum  
in capite & pectori proruimpentes extre-  
mitatibus eodem tempore frigentibus,  
respiratio laboriosa, dysenteriæ, motus  
convulsivi, petechiæ, hæmorrhargiæ,  
vibices, anima & sudor fætens, sitis  
vehemens & magnus calor internus æ-  
gruin excrucians externis signis non pa-  
tens,

tens, qui multo major est, quam febris violentia, tandem plerumque mors.

Plurimum inter primum & quartum morbi diem moriuntur, alii 5-6. die, ad septimum vel undecimum diem productus morbus rarer est, nonnulli post vicesimum febre lenta pereunt a); tumque eorum cadavera celerrime putrescunt, intumescunt & fætent, imo jam in mortis articulo subviridi colore inficiuntur.

In nonnullis contingunt in peste metastases ad pubem oculos & ad summas manus ac Pedes, ita ut sphacelo hæ partes consumantur. Alii evadunt cum remanente oblivious omnium rerum.

### §. 9.

#### *Decursus pestis speciales.*

Hæc de decursu pestis generali fure. Secundum diversitatem corporum singulorum, & constitutionem diversa rur-

D 2

fus.

a) Maekenzie L. C.



sus in hoc vel illo ægro sunt symptomata; hinc dividi debet pestis.

1. *In inflammatoriam*: in hac specie calor magnus, æquabilis, sitis ingens, cutis sicca, urina ruffa, genæ rubentes, delirium ferox, pulsus fortis, sanguis inflammatorius, bubones inflammati, dolorantes, rubri a). Judicatur hæc pestis per bubones in suppurationem abeuntes, & curatur antiphlogisticis nec non venæseptione b).

2. *In putridam*, quæ frequentissima est, in ea animadvertisuntur præprimis subita

a) Sydenh. L. C. Chicoineau L. C. I. p. 570.  
Chenot L. C. p. 63. I24. Mertens p. 101.

b) An huic pestis speciei scilicet inflammatoriae bubones solummodo proprii vel etiam anthraces? recte quærit. Cel. Selle in rudimentis pyretologiæ p. 148. Negat anthraces pesti melioris indolis adesse, cum ipsi plerumque putredinem bilis atquæ sanguinis sequantur.

subita virium prostratio, calor interdum mordax, pulsus non respondens, interdum paucus, tremor manuum, anxieties, pulsus debilis inæqualis, petechiae, vibices, Hæmorrhagiæ, animi deliquia. bubones & carbunculi nigrescentes, facillimeque in gangrænam transeuntes, anima sudorque fætens, fæces liquidæ fœtidæ a).

Potissimum regnat ea, si miasma pestilentiale valde corrosivum, aer universalis putridus & corpus ad putredinem dispositum sit.

3. In *bilioſam*: eam designant signa colluviei biliosæ, ut insignis oris amaror, nausea, vomitus bilis, lingua sordida, arida, hypochondriorum tensio, diarrhæa biliosa fœtida.

D 3

Ori-

a) Mackenzie Philosophi. transact. P. L. IV.  
pag. 74. Chenot pag. 64.

Oritur plerumque autumno post  
fervidos aestates, unde bilis acrimoniam  
contraxit. Sæpe tunc materia pestis se  
ad intestina deponit & diarrhæas cum  
levamine excitat a).

4. In *nervosam*: in hac pestis specie  
maxima nervorum perturbatio invenitur.  
Calor valde mitis est fere ut in sanis,  
sitis nulla aut pauca, pulsus mollis, par-  
vus, celer inæqualis, lingua in initio  
alba, dein rubra, ultimo nigra, & sicca.  
Ægri se leviter ægrotare putant, donec  
summa virium prostratio eos subito ruit,  
calor qui in morbo proiectiori tactui-  
plerumque naturalis appareat, interne-  
urens est, urinæ crudæ aquosæ, anxi-  
tates, vomitus æruginosæ, atri, cruenti,  
vertigo, temulentia, balbuties, tre-  
mor, stupor, abjectio animi, deliria mi-  
tia, animi deliquia, convulsiones, &  
tandem mors, succedens sæpe post ali-  
quot

---

a) *Foresi opera omnia libri VI. observat.* 12.  
*Chenot p. 63. 146.*

quot horas vel dies absque bubonibus & anthracibus. vid. Cel. Chiccinau P. 1. pag. 57. 242. 224. 244. Chenot p. 66. Mertens pag. 42.

### §. 10.

#### *Pestes complicatæ inter se.*

Harum in præcedenti paragrapho nominatarum pestis specierum pro diversitate rerum jungi solent in hoc vel illo subjecto plures vel pauciores. Præcipuae tales complicationes sunt:

1. *Pestis inflammatorio - biliosa*, in qua sunt signa colluviei biliosæ & diatheseos phlogisticæ. Vid. Chenot. p. 65. 146.

2. *Bilioſo - putrida*, cum colluvie biliosa & humorum putredine.

3. *Inflammatorio - putrida* cum diathesi phlogistica seu inflammatione quadam & dissolutione sanguinis.

4. *Bilioſo - nervoſa*, cum colluvie  
bilioſa & ſymptomatibus nervoſis. Vid.  
*Chenot.* p. 61, 146. 166.

5. *Nervoſo - putrida*, quæ frequen-  
tissima & periculofiffima. In hac conta-  
gium ſimul tam humores quam neryos  
afficit. Pulfus eſt celer contraetus inae-  
qualis, preſſa arteria evanescens, fi-  
tis, nauſea, vomitus æruginofii cruenti  
vel atri, æſtus interne urens, externe  
naturalem non ſuperans, ingens cepha-  
lalgia, oculi torvi, vagi, lingua initio  
alba, dein nigra, deliria, hæmorrhagiæ,  
petechiæ, vibices, bubonum &  
anthracum eruptio acrius dolentium, ni-  
grefſcentium. Facillimeque in gangræ-  
nam tranſeuntium. Vid. *Chicoinau* P. I.  
pag. 38. 250. 318. *Chenot.* pag. 64.

## §. II.

*Aphorismi illustrantes pestis historiam præcedentibus propositam.*

1. Dum pestis novum subit locum in omni epidemia in ortu & decursu non eadem sicutur forma. Nonnunquam enim jam in ortu subitam & vehementem excitat stragem, remittit dein acutie pro aeris vicissitudine, vicissim rursus exacerbatur & tandem pedetentim evanescit, & cum attigerit summum gradum subito cessat.

2. Nonnunquam pestis sui juris paucos tantum ferit & sponte extinguitur; quando nunquam, ut supra ostendi, praesens aeris constitutio non favet ejus propagationi.

3. In pagis ex certa hominum quantitate pauciores, quam in urbibus percutunt peste.

4. Ratio, cur hic facilius, diffici-  
lius, levius, gravius alius vel plane non  
afficiatur peste, non ita quæri debet in  
singulari differentia miasmatis pestilentia-  
lis corpori applicati, quam potius in  
circumstantiis conditionis corporis, in  
quo tunc temporis homo existit, & præ-  
cipue in diversa corporis dispositione seu  
receptivitate. Id quod in insitione va-  
riolarum dudum expertum est.

5. Peste semper plures, totidem vel  
salem moriuntur, quot evadunt. Hoc  
ultimum contingit hyeme. Initio pestis  
pauci evadunt, circa finem plures sa-  
nantur, quam pereunt: forte ideo, quia  
pestis hyeme benignior est, paucio-  
res æstate invadit & plerumque hy-  
eme cessat.

6. Hyeme pestis se non tam cito ex-  
tendit, nec adeo populariter regnat, ut  
æstate, habemus tamen etiam exempla  
pestium hybernalium eopiosarum.

7. Ex determinato infectorum numero ut plurimum hyeme & prope hyemem plures sanantur, quam exeunte vere, tota æstate & ineunte autumno.

8. Maxima morientium pars septimum diem non attingit. Plurimi abeunt ad patres circa quartum, aliqui circa septimum. Convalescentes contra diutius septem diebus ut plurimum ægrotant.

9. Rarissime sponte cessat pestis æstate, frequentissime hyeme vel maxime initio veris. Omni quidem anni tempore suos fines pretendere valet. Ita 1713 siluit Augusto & Septembri, in non nullis locis agri vindobonensis, item 1736 in epidemia transylvanica in oppidulo Tertlau ineunte Octobri, qui sat calidus fuit, dum suburbium Coronense multa adhuc funera videbat, pestis extinta est. Observatio tamen in Europa docuit, quod si vere aut æstate incessiter ibidem sequente hyeme cessat, si vero eam autumnus invexerit, longius plerum-

plerumque pretendatur, tandem in loco, quem nuper invaserat, intra sedem menses extingui solet.

Io. Rarissima acutissimaque pestis est illa, in qua nullum exanthema in corpore nec ante nec post mortem percipi potest. In iis, qui ante sextum vel sexto ipso die moriuntur ante & post mortem animadvertisuntur nigræ lenticulares petechiæ solæ vel junctæ bubonibus eo minoribus, quo minus temporis duraverit morbus.

II. Dubium mihi videtur, an peste in aliquo loco furente semper absint alii vulgares morbi, quæ sententia axioma fuit hucusque pestis scriptoribus. Negat idem etiam Cel. Mertens (L. C. pag. 186.) contendendo cum peste Moscovitica anni 1771 non tantum morbos sporadicos, verum quoque epidemicos ut morbos copiose occurrisse. Nec video cur alii epidemici sileant tempore pestis, cum in constitutione variolosa occurrant etiam alii vulgares morbi.

Paucio-

Pauciores equidem nonnunquam fuisse morbos alios epidemicos vel plane ex toto siluisse tempore pestis lubenter concedo, quia in plurimis epidemiis pestilentialibus tempestas fuit optima. Sed extra pestem etiam saepe aestate nonnunquam, imo aestate ipsa calidissima pauci observantur morbi favente tempestate; vicissim alii copiosi morbi cujuscunque generis existunt, quia non semper eadem aeris constitutio manet. Quomodo ergo inde universalem legem formabis?

### §. 12.

#### *Prognosis.*

Sequitur, ut de quibusdam prognosin spectantibus verba faciam. In genere, hoc applicari possunt omnia, quae in febribus malignis quid boni vel mali protendunt.

Differt prognosis ratione subiecti, vehementiae morbi: qualitatis miasmatis

tis pestilentialis, loci, tempestatis, anni temporibus, complicationis, dispositionis corporis & ætatis. Cum itaque omnibus ægris pestiferis symptomata communia non sint, insignis difficultas manet in præsagienda vita & morte, præsertim in morbo tam præcipiti, fallaci ac insidioso, qualis pestis est. Interdum enim ab initio morbus ægro vix gravis videtur, brevi tamen infelix succedit mutatio, interdum ægro vix de anxietate præcordiorum conqueruntur vomituque agitantur, interdum tristia se offerunt symptomata, sed brevi post sanitati restituitur æger *a*).

In universum pestis junioribus magis, quam ætate provectionibus, fœminis magis quam viris *b*). Cholericis & sanguini-

*a) Russel L. C. p. 229.*

*b) Dauer L. C. juniores, fœminæ, sanguinei, cholerici, robusti, ideo ætate provectione.*

sanguineis magis quam phlegmaticis a)  
tenuioris conditionis hominibus citius  
quam bene viventibus funesta esse solet.  
Ægrius etiam cæteris paribus podagri-  
ei & hydropici peste corripiuntur b).

Intelli-

---

vestioribus viris, phlegmaticis, melan-  
cholicis, veletudinariis potius peste affi-  
ciuntur, quia ipsi plus transpirant & sese  
magis contagio exponunt adeoque & id  
facilius suscipere possunt. Pauperes quo-  
que magis ditioribus necantur, quia pau-  
peres misere vivunt & contagio plus ex-  
positi sunt, quam divites, qui bene edunt,  
bibunt & ab aliis separati se domi inclu-  
dere possunt. Timidi etiam male se ha-  
bent plerumque, quia transpiratio in eis  
minuitur, resorptum in corpore retinetur.  
Plus adhuc variare pestium epidemias  
diversas in qualitate subjectorum corripien-  
dorum edocent historiæ a Cel. Ferro  
productæ. L. c. pag. 32.

a) Chenot L. C. pag. 43.

a) Chenot L. C. p. 47. Mertens L. C. phty-  
sin, scabiem, fontanellas, uleera antiqua,  
quarta.

Intelligenda vero priora sunt in ortu tantum morbi, furente enim peste sine discrimine ullo omnes aggreditur ea. Moriuntur in furore pestis fere omnes. Exspectari a viribus naturæ & medicamentorum aliquid potest in mitiori tantum malo.

Judicatur iisdem crīsibus pestis, quae solemnes sunt feribus acutis malignis in genere, potissimum vero sudore Critico & bubonibus, interdum vomitu, diarrhæis & narium vel hæmorrhoidum fluxu. An vero hæc crīsis diebus vulgo criticis diētis & quibus contingat, aliis accuratius determinandum relinquo, hos enim autores aliquos nominasse, plurimos vero de iis tacuisse lego, in morte præsertim natura nullum

quartanam & gonorrhæam vero contra pestem non munire ostendunt Schreiber L. C. pag. 30. Chenot pag. 47 & Mertens in ægtis cum iisdem morbis peste extintis.

lum servat typum, moriuntur enim ægri primo-sesto-septimo ad undecimum diem, alii post vicesimum, pluri tamen ante septimum. Vid. Cel. Mackenzie. L. C. Chenot L. C. Mertens pag. 102.

Bonum morbi exitum sibi polliceri æger potest, qui viribus præditus quartum morbi diem vivit: tutiorem, qui septimum, si simul in eo adsit levis & æqualis calor, pulsus constanter fortis, bubones & carbunculi cum levamine ægri, cessatione nauseæ & anxietatis nec non cum sudore apparentes.

Veram & perfectam crisin a bubonibus exspectare licet, si cito bubones cum aliis bonis signis, cum sufficientibus ægri viribus & sine febre magna prorumpunt, sensim mole augentur, dolent, rubent, ad suppurationem tendunt, aperiuntur, pus bonum fundunt, & reliqua symptomata morbi mitiora fiunt. Vulgare hoc post septimum diem; nunquam ante septimum diem rumpunt, rupti dein per 4-8 & plures dies pus

fundunt. Valde autem mature cum mali signis erumpentes vel cunctanter prodeuntes, non levantes aut cum virium decreimento retrocedentes bubones sunt symptomatici & valde mali. Pessimi item cum febre non magna, mitique viribus prostratis. Celeriter increscentes, magni & flaccidi & molles, seu nec inflammati nec dolentes bubones spem fallacem edunt. Malum, si fusci cinerei, malum etiam si buboni carbunculus insideat a).

Bonum dein si bubones rupti pus album, crassum, leve, æquale habent; malum, si ichorosum. Sciendum etiam est, parotides non adeo completam crisin pericere ac bubones inguinales vel subaxillares.

Car-

---

a) Non semper vero lethale idem fuit in epidemia Coronensi anni 1718.

Carbunculi principio morbi vel paulo post in locis carnosis apparentes cum febre majore, viribus non valde prostratis, non sunt omnino pessimipericulosi vero, qui ab initio vel paulo post cum miti febre malisque signis apparent. In manuum pedumque digitis, prope tendinem Achillis, sub poplitibus, in mammarum peripheria, in que spina dorsi exitum portendunt, vel si multi erumpant vel bubonum loco in locis glandulosis proveniant, aut bubonibus insideant. Tardius prodeuntes etiam mali. Depressi & late serpentes difficillimi. Calamitosi etiam, qui in principio, dum erumpunt subsident, recurrunt. Leviores sunt e contra, qui intra duos tresve dies rubra probeque inflammata basi circumdantur & elevantur.

Quo citius, quo plura, quo graviora conspiciuntur symptomata, qualia vulgarium morborum funestos exitus indicant, eo pejus res ægri peste infecti

fecti agitur. Ideo pestis complicata lethalior solitaria.

Ægri, quibus usque ad quartum diem bubones vel carbunculi non erumpunt nec sudore levantur, simulque magno calore & dolore capitis vexantur, moriuntur cum vel sine petechiis die tertio - quinto. Abeunt etiam ad patres, quibus quidem provenire bubones & carbunculi, somnolentia vero, anxietates aliaque symptomata mala præcedentia manent vel adhuc augentur iis egressis.

Vomitus & alvi fluxus sine virium decremento, & petechiæ miliares quarto septimoque die apparentes nullum vitæ minantur periculum. Si vero vomitus post aliquot dies non cesset & perduret, malum est; indicat enim inflammationem vel in cerebro vel in ventriculo. Lethalis etiam fluxus alvi ex colliquatione humorum oriundis.

Calor

Calor nimius & mitis uterque malus, pejor si simul inæqualis, petechiæ latæ nigræ ab initio conspicuæ lethales; serius apparentes vix exitiales, si sub largissimo sudore calido rubicundiores fiant, malum vero, si contra. Vibices a) plerumque lethales:

Subita & ingens virium prostratio cum fatuitate & balbutie conjuncta necat, item deliria in principio morbi nata, crebra animi deliquia, sopores, sternutationes frequentes, motus tremuli manuum, pedum & linguæ, subsultus tendinum, dolor in gutture sine inflammatione, lingua nigra, tussis, respiratio laboriosa, dolor in visceribus quibuscumque præsertim obtusus & gravatus, singultus.

E 3

Hæ-

a) Fœmina tamen; in cuius corpore fuere bubones carbunculi & vibices convaluit in epidemia Coronensi. 1718.

Hæmorrhagia narium & Hæmorrhoides initio corpora quædam plethorica levasse, interdum observatum est. Post tertium quartum diem vero valde periculosa, præsertim parca stillicidia narium. Item defectiones alvi cruentæ, hæmoptisis, vomitus cruentus, mictus cruentus, fluxus menstruus. Gravidæ abortum patiuntur sive oinnes & moriuntur hæmorrhagiis a).

Urinæ sanorum similes sæpe lethales, etiamsi nulla alia symptomata gravia compareant, turbidæ malæ quidem, at non tam periculosæ. Pingues, oleosæ, nigræ, lividæ hypostasin nigram vel lividam habentes plerumque pariter exitiales haberri debent.

## §. 6.

*Cura prophylactica.*

Regno cuidam imminere pestem, suspiciendum est, si in vicinis regionibus

a) Mertens L. C. p. 144.

bus eadem regnet. In quo periculo nostræ regiones, quia vicinæ semper versantur propter continuum cum eis commercium vel interdum bellum. Periculum eo magis pertimescendum erit, si annonæ penuria, aer calidus, ac humidus sit, & graves febres putridæ epidemiceæ in eodem regno decurrant. Avertendæ itaque pestis at nos propagatio-  
nis causa ex benignissima Principum nostrorum providentia ob endemicum in terris Turcicis morbum continuæ ador-  
natæ sunt in finibus nostris excubiæ se-  
cundum lineas, mercium & hominum exploratio, eorumque reservatio in ædi-  
bus commodis per aliquot tempus, quod Cel. Rosenstein ad 15-20 dies restringi vult, experientiam enim provocat, quod non ultra septem dies delituisset vene-  
num pestilentiale in corpore humano a).

E 4

Mer-

---

a) Kœleserus non ultra tres dies idem in cor-  
pore delitescere afferit



Merces aeri exponuntur, & ita dein quantum licet purificatæ (nam ex toto impossibile est, uti etiam Chenot docet) infectæ & non infectæ ad nos & alias regiones transferuntur. Nihilominus per vias occultas Walachi pestem in nostras terras ex regionibus Turcicis sæpe attulisse constat, cuius jam supra in præfatione mentionem feci.

*Intrasse ipsam pestem in regiones nostras cogitandum est, si in aliquo loco inter easdem ædes multi, subito morbo corripiantur, plures pereant, & quidem plerique ante finem diei quarti, alii quoque, qui ægros adierint, afficiantur; præsertim si bubones & carbunculi prorumpant. Cognitis his distinctis pestis characteribus, si quis tamen adhuc de pestis præsentia dubitare vellet, suadent autores, ut malefici apud infectos domicilio per aliquod tempus includantur, eorumque vestibus involvantur, contagium non diu manebit occultum in ipsis.*

De existentia pestis certis nunc factis ut sistatur ulterior propagatio, omnis opera navanda est. Hinc sanis ditionibus suadeatur fuga in alias regiones, pagos, bona; ea enim optima prophylaxis. Inter reliquos in eadem loco mansuros omne commercium cum loco infecto, seu urbs, seu pagus fuerit, praesertim cum domiciliis infectis tollatur; non minus etiam cum suspectis evitetur: hinc.

I. Infecti & suspecti transportentur in nosomia, non vero ampla, sed ex singulis contabernaculis exstructa a). Suspecti utantur diaphoreticis, sero lactis vino & balneis, & si per septem dies sanii

a) Bene perpendendum vero etiam est nosocomia ab altera parte multum danni patere. Timor enim nosocomii, absentia ab amicis, crudelis tractatio, aer putridus nosocomiorum, cura manca plurimos necare ibi debent, qui domi sanari potuerint.

sani manserint, induant vestes munda-  
tas, & abeant ex nosocomio. Recon-  
valescentes a peste itidem aceto abluen-  
di, novisque vestibus vestiendi, ante-  
quam inter sanos exeant. Infectorum  
res infectæ purifcentur aere libero, ig-  
ne, suffitu, sulphure, & lotione cum  
aqua & aceto; domicilia eorum itidem.  
Non manibus vero apprehendere res  
infectas suadet servis Cel. *Mertens* sed  
forcipibus, quia alias ipsi facile ita in-  
fici possent.

2. Mundities publica & privata cum  
renovatione aeris in domibus recommen-  
detur; terrores panici suprimmantur;  
cadavera absque rumore nocte sepelian-  
tur, & annonæ penuriæ præcaveatur;  
separationes enim locorum pestilentia-  
lium manente penuria plus pestem au-  
gent, quam minuunt, ipsæ enim impe-  
dito commercio paupertatem augent, &  
ex ea graves morbi putridi succedunt.

3. Cæterum omnes conventus pub-  
lici tollantur, & unusquisque se inclu-  
dat.

dat domiciliis suis. Ergo immediatum contactum inter sanos & ægros evitet omnis homo.

4. Medici, clerici, iisque qui ægros adire debent, eos ne adeant ante jentaculum, nec sudantes. Suadet priori scopo Cel. *Rosenstein* panem biscoctum aceto vini intinctum vel panem butyro obductum ruta commixto. Nec inutile mihi videtur consilium nonnullorum auctorum, quo recommandant super vestes pallium ex tela piceata factum aceto saepius abluendum, similesque chirothecas & ocreas. Præterea industria sapone lavari non debent, sed aceti vapore madefieri, & vestes sulphuris fumo in aere libero subinde imbuere. Sanus mansit chirurgus in epidemia Coronensi anni 1718, qui masticavit radicem zedoariæ & sumavit vestes saepè sulphure. Denique commercium cum ægris quantum licet, evitent medici, hinc si convenientius æger est, non nimis prope ad illum accedat, nec faciem illi admoveat,  
reti-

retinendus vero est spiritus, si comminus eum investigare opus est, & mox postea acetum olfaciendum vel pánis vel spongia aceto madefacta ante os servandus. Salivam ne deglutiant & domi reversi ne ingerant quid, antequam os pauxillo aceti colluerint.

5. An remedium prophylacticum adversus pestis contagium in rerum natura existat a longo jam tempore quæsumum est. Post multas factas observationes jam aperte patet nos eo adhuc carere. Et quæso quomodo invenies specificum adversus pestem cuique conveniens, cum status corporis adeo diversus in omnibus sit, ut idem remedium omnibus applicatum plane non convenient, imo nocere debeat. Patet hinc quam nociva ab omni ævo laudata alexipharmacæ quam plurimis hominibus fuerint. Unicus cortex peruvianus acetum & succus citri mihi remedia esse videntur, a quibus in plurimis hominibus plurimum expectari poterit. Mecum consentiunt de eo optimi medici: præter alios Russel ex-

extraëti vel infusi aquosi forma cortium peruvianum utilem sentit, & nuper eum suadet Cel. Culien a) cum camphora. Cum enim pestis symptomata humorum putredinem & nervorum perturbationem ut plurimum involvant, huic corporis statui ipsum obviam ire, morbumque leviorem facere, seu corpus aliquomodo munire ad non vel minus suscipiendum contagium poterit.

Optimum cæterum prophylacticum est fiducia animique constantia, res domi non angusta, vita sobria, mundities, viëtus temperans acidulus, modicus vini usus, corpus sanum, et si impurum, ejus emendatio pro singulari suo statu vitioso quantum licet, masticatoria, & fumus tabaci.

#### §. 14.

---

a) Russel L. C. Cullen Anfangsgründe der praktischen Arzneywissenschaft. t. 2. p. 25.




## §. 7.

*Cura Pestis radicalis.*

Ex iis, quæ in paragrapho præcedenti dicta sunt jam facile patebit, quid de medicina specifica præsente ipsa pestis, quæ miasma in corpus humanum receptum vi quadam peculiari iners reddere vel destruere valeat, vere fentendum, & an vere quædam talis laudanda fuerit? ingenue fateri debo, me nescire ullam, nec empiricam nec methodicam. Indocti analogon specificum ut cortex peruvianus in febribus est, invenire non potuerunt, & docti non valuere ex principiis medicis eruere medicamentum, quod corruptionem Humorum incipientem tam cito avertere & natam emendare valeret, uti miasma pestilentiale eandem corpori humano inducit. Nescio an in eo lateat causa lethalitatis tantæ pestis, quod hucusque medici pestiferis assistentes nimis timidi & nimis parci in medicamentorum dosibus fuere, vel quia in materia medica hodi-

hodierna nullum adhuc medicamentum satis actuosum contra hostem adeo præcipitem cognitum est. Contra variolas nullum exstat adhuc specificum, cum tamen morbus minus periculosus & miasma variolosum minus subtile sit pestilentiali, quæ pauca spes refulget ergo pro specifico antipestilentiali?

Deficiente itaque specifico secundum analogiam statum corporis, & symptomata uti in variolis aggredi peste debemus; attendendo ad molimina naturæ, ut ea non turbemus, sed succuremus, ut quanto citius expellatur contagium ex corpore, quod fit in peste vel plenaria expulsione per sudores, vel depositione per bubones & carbunculos, simulque sudore, id efficies, si vires nimis intensæ erunt (quod vero raro fit) eas solvendo, si vero debilitatæ ex dissolutione sanguinis putrida, vel ex statu laxo aquoso eas erigendo roborantibus antisepcticis nervinis (quæ quidem indicatio frequentissima), si bilis turgens corpus turbet, eam ejiciendo. De singulis his



pestis speciebus earumque cura fusius quædam dicam; adeoque.

### I. De cura pestis inflammatoria.

Multum inter optimos autores disputatum est, an in peste secari possit & debeat vena? Occurrunt exempla non pauca salubriter initio missi sanguinis. Vicissim autem non desunt multa infelicia exempla. Hinc accurate determinandum erit, in quo casu tuto suscipi venæsecatio possit. Hoc jam aperte patet pestilentiae solæ causa venam non esse mittendam, sed tantum præsente plethora, ne nimius Humorum motus miasmatis excretionem abscessuum maturationem impedit. Quare in plethorico Corpo-re, ubi febris major est malignitate, initio morbi, ante tumorum eruptionem, & præsertim si diæta æstuosa præcesserit, æger ætatis vegetæ sit, ubi pulsus plenus, tensus, fortis, dolor acutus capit, si æger ab initio statim in soporem incidat, deliret, respirationem difficilem pleuritici vel peripneumonici aliquid habeat,

habeat, metusque adsit futuræ pleuritidis, sanguinem omnino mittere vel saltem scarificare licebit a). In genere sub iisdem conditionibus sanguis mitti potest in peste, uti in altero stadio febrium putridarum regulæ traduntur.

Absente plethora & in progressu morbi in primis post quamlibet materiae malignæ eruptionem æque pernicioſa est venæſectio , ac alvi evacuatio b).

Ingens post venæ ſectionem remedium est emeticum ex ipecacuanha initio morbi exhibitum, si æger facile vomat, vires habeat, vel, ut ſæpe fit, ſi inter prandium cænamque pestilentia prædromos ſentiat, adlatumque forte a quodam halans contagium cum cibo vel ſalvia-deglutiverit, vomitibus fe-

pro-

a) *Sydenh.*, L. C. pag. 75. *Chenot.* pag. 129.  
*Mertens* pag. 137.

b) *Mackenzie* L. C.

prodens a). Annotavit Cl. Albrich memorabiles casus ex epidemia Coronensi anni 1718, in quibus post emetica statim propinata, & postea data levia sudorifera morbus initio supprimebatur & plenaria curatio succedebat. Emetico hærens in ventriculo contagium eliminare & transpirationem promovere, atque residui quantitatem aliquam ejicere possumus, adeoque si non penitus sufflammant pestem incipientem emetica, eam tamen minuunt, levantque. Inde Diemberbroeck annotavit eos, qui initio vomissent sponte, mitius tulisse morbum, & quosdam bubonibus & carbunculis caruisse. Autor epistolæ apud Cel. Ferro Constantinopoli emetico quoque initio morbi exhibito subito morbo finem factum esse refert.

Re-

---

a) Mead. de peste. Schreiber. L. C. Mertens pag. 136. Ferro L. C. pag. 77.

Reliqua materiae contagiosae pars in sanguine existens quanto citius expelli studeatur sudore leni in lecto, non tincturis & essentiis bezoardicis, verum iis, quæ diluunt & materiam sudori aptam præstant; & simul ob coniunctum acidum corporis putredinem inhibitent. Taliæ sunt: decoctum Hordei, florum sambuci, scabiosæ cum aceto & melle, succo citri: cremore tartari, roob sambuci, nitro, antimonio diaphoretico, camphora, sero lactis.

## 2. *Medela pestis biliosæ.*

Præcipua in hac remedia sunt evacuantia & diaphoretica, interdum dein antiseptica roborantia.

Evacuantium classem absolvunt emetica purgantia & clysmata. Conveniunt emetica initio morbi, seu die prima data tam, ut supra dixi, ad venenum pestilentiae ex ventriculo ejendum, quam ad materiam biliosam turbulentem eliminandam. Si vero nec plen-

nitudo ventriculi nec suspicio deglutiti contagii seu cum cibo, seu cum saliva in clauso præfertim conclavi, ubi æger aliis pestiferus decumbit, imo inflammatio ventriculi, vel aliis visceris adsit, nec non in progressu morbi prudenter abstinebis ab emetico.

Ab alvum ducentibus etiam remediis ferio dissuadent Autores optimi, atque a lenissimus lethales diarrhæas cum animi deliquiis se observasse memorant, interim ubi plenitudo ventriculi, diuturna alyi obstructio, murmurationes ventris, meteorismus, dolores in lumbis saburraque intestinalium adest, clysmatum usui locum adesse quis prudens Medicus negabit?

Evacuata primarum viarum saburra de promovenda transpiratione remediis in paragrapho præcedenti laudatis cogitandam est, si que dein vires frangantur, vel fractæ jam sint, eæ sunt erigendæ nervinis roborantibus, sine mora præscriptis simul.

• • • •

### 3. Curatio pestis putridæ.

Cum in pestilentiis putridis adsit dissolutio sanguinis putrida, viriumque languor, ergo removenda sunt omnia debilitantia, ut venæfæctiones, purgantia, & præter emetica solummodo ordinanda talia, quæ putredini resistunt, debilitatem tolunt, & roberante excitant, calefaciente & stimulante vi gaudent. Talia sunt cortex peruvianus <sup>a)</sup>. Camphora, spiritus vitrioli, succus citri, acetum, flores arnicæ, rad. arnicæ, valerianæ, alumen, terra japonica, folia rutæ, scordii, cortices aurantiorum; radix serpentariæ virginianæ, Angelicæ, contrajervæ, Myrrha, flores chamomillæ, acetum rutæ, florum Calendulæ, rosarum, camphoratum, bezoardicum mynsichti, prophylacticum, vinum & vesicantia.

F 3

Pro

<sup>a)</sup> Mackenzie L. C. Mertens pag. 130. Cheno. L. C. aliqui jam bono cum successu eodem in peste usi sunt.

Pro præcipuis morbi symptomatibus tollendis vel leniendis præcipua rursus adhibenda sunt remedia. Ita si æger deliret cum pulsu forti & oculis rubicundis, scarifica Nucham vel applica capiti Hirudines, & pedibus sinapismos, præscribendo simul acida, corticem peruvianum & camphoram cum Nitro. Si vero cum pulsu debili deliret & facie pallida, applica vescicantia & interne da corticem peruvianum. Moschum, vinum, camphoram. Eadem remedia oppones comati.

Egregie conveniunt contra syncopem situs horizontalis, vinum & roborantia, nec non ad nares acetum vel spirituosa.

Contra subsultus tendinum, tremores, convulsiones Moschus, camphora, spiritus C. C., vescicantia, contra vermes valerianæ sylv. radix.

Vomitus ex saburra primarum viarum curatur Ipecacuanha: ea absente, si nulla viscerum inflammatio adsit, theriaca cum aceto & camphora.

Anxietates levabis, si ex saburra primarum viarum emeticō, si ab ataxia, stimulantibus, si ex animi pathematibus paregoricis, si ex plethora venæsectione.

Ardor stomachi si ex bile oriundus poscit emeticum, si ex inflammatione antiphlogistica, si a veneno pestilentiali, cardiaca nervina.

Hæmorrhagiæ sunt sistendæ alumine, terra japonica, vino rubro, cortice peruviano, spiritu vitrioli.

Sudores excessivi poscunt regimen temperatum, corticem peruv. spirit. vitrioli, alumen, salviam, vinum rubrum.

Diarrheæ si moderatæ levantes si bi relinquendæ; si colliquativæ susten-dæ spirit. vitrioli, rad. arnicæ, cascarilla, cort. peruv. simaruba, terra japonica, ele&t. diacordii. Gangræna in aliqua parte oriens curatur methodo chirurgica, & scabies reconyalescentes vel etiam restitutos a peste infestans, al-vum laxantibus remedis.

#### 4 Methodus medendæ pestis nervosæ,

In periculosa hac pestis specie at-tentio potissimum ad nervorum pertur-bationem est dirigenda: præscribenda remedia quæ vi nervina sedante gaudent, ut moschus, camphora, rad. valerianæ sylv. mixtura simplex, liquor C. C. suc. spiritus C. C. cum aceto vel spirit. vi-trioli saturatus, elixir vitrioli, vinum, flores chamomillæ, crocus, cortices au-rantiorum, herba menthæ, melissæ, tinc-turæ bezoardicæ, & præprimis tinctura alexipharmacæ Huxhami, nec non ves-i-cantia.

Cæterum removeantur omnia, quæ nervis inimica sunt, ut venæsectio, purgantia. Non spernendum vero hic pariter emeticum in casibus supra laudatis.

### 5. Cura pestium complicatarum.

Ex antecedentibus patet nonnunquam harum nominatarum pestis specierum concurrere aliquas in eodem subiecto, pestesque constituere complicatas: complicata in eis pariter medela esse debet, quæ vero facile ex antedictis erui poterit. Pestis itaque.

a) *Inflammatorio - bilioſa* curatur emeticis & antisepticis.

b) *Bilioſo - putrida* sanatur emeticis & antisepticis.

c) *Inflammatorio-putrida* temperantibus cum antisepticis.

d) *Bilioſo - nervosa* emeticis & nervinis.



e) *Nervoso-putrida antisepticis & nervinis.*

Si pestis complicata fuerit cum alio morbo e. g. febrili, respiciendum est ad febris genium, remediaque ei adaptata præscribenda sunt, uti ex præcedentibus elucebit. Si vero morbus conjunctus non febrilis, tunc ad solam pestem respiciendum, & ea sublata de sanando eo tantum cogitandum erit.

S. 15.

*Therapia bubonum & carbunculorum.*

Super est, ut addam quædam de bubonum & carbunculorum therapia. Ex iis quæ in præcedentibus de crisi per bubones dixi facile elucebit ejus mæde-  
la: promotio nempe suppurationis in iis-  
dem. Hic attigitur scopus cataplasmate  
ex speciebus emollientibus, si multum  
inflammati fuerint bubones; si vero pa-  
rum dolorifici & inflammati, metusque  
ad sit retrocessionis, figi & inflammari de-  
bent

bent speciebus emollientibus, additis cepis assatis, fermento panis, unguento digestivo, gummi ammoniaco aceto soluto, empl. Diachylo composito, unguento basiliconis, vel etiam cantharidibus, non omissis pariter internis sudoriferis nervinis. Bene dein suppurati, si sponte non rumpantur, aperiantur cultro, & sanentur lege artis.

Carbunculorum medela est, ut emollientur, aperiantur, separentur a reliqua parte sana, & sphacelus praecaveatur. Id optime peragitur cataplasmate ex speciebus emollientibus cum antisepticis, ut seminibus lini, floribus chamomillæ, mica panis, pulvere cort. peruv. & aceto. Addere iis vero simul poteris fermentum panis, theriacam, cepam, si carbunculus flaccidus, minimeque dolorificus fuerit. Aperto carbunculo applica cort. peruv. myrrham, camphoram, & sana secundum chirurgiæ regulas.

## §. 16.

*De diæta in peste.*

Regimen in peste esse debet idem, ac in febribus putridis. In genere recommendanda in priinis sunt acida, animi tranquilitas, vita sobria, levis exercitatio corporis, mundities, aer liber purus, cubicolorum aeris frequens renovatio vapore aceti camphorati, fumo baccarum juniperi, pulveris pyrii, sulphuris. Vitanda e contrario omnia cruda, lardum, caro suilla, anguillæ, caro salita & fumo indurata, allium, cepa, abusus spiritus vini a), frigus, calor, libido, animi commotiones fortiores, terror & ira-

a) Crediderunt nonnulli se spiritu vini tanquam antiseptico fortissimo præmunire posse contra pestis contagium. Verum ea tamen multi mortui sunt observante Cel. Schreiber, cum enim sanguinem inflammat spiritus vini, augere in plurimis effectus miasmatis pestilentialis debet.

ira: periculosior enim pestis post iram  
ingentem & terrorem exorta.

Debilibus & reconvalcentibus mul-  
tum levaminis adfert vinum aqua tem-  
peratum.

### S. 17.

#### *Monita practica.*

1. Stimulantia præservative sumpta  
pestem potius accersunt, quam arcent;  
Nam in quamplurimis subiectis præ-  
fertim sanguineis & cholericis sanis  
inflammare sanguinem, & inde alios mor-  
bos generare solent.

2. Cum adeo necessaria crisis in peste  
sit levis sudor, omni opera promovendus  
ille est. Nocent vero tinturæ & essen-  
tiæ bezoardicæ, salia volatilia, & olea  
ætherea ab omni ævo in hunc scopum  
jaudata, quia non cuivis corporis con-  
stitutioni adaptæ sunt, & si quem ser-  
varunt, non suo auxilio, sed ægri ipsius  
robo-

robore servarunt. Hinc in epidemia Coronensi anni 1718 aperte fatetur Cel. Albrich plures cum, quam sine medicina esse mortuos. Exulenda igitur sunt in peste plurima alexipharmacum, nimio enim sudore totum corpus plus inflammatur, natura turbatur, debilitatur, bubones annotante Sydenhamo a) saepe retropelluntur, cum consequente morte. Et multi praesertim calidioris temperamenti juvenes conficiuntur cum phrenitide & petechis b). Nocet etiam opium tam ut remedium prophylacticum, quam curativum, opium enim inflammat & gangrenam promovet c).

3 Cave buboni discutientia applicare, conducunt potius sola emollientia. Emolitus is, si non sponte rumpat, potius

a) *Sydenham L. C.* pag. 70.

b) *Chenot L. C.* pag. 96.

c) *Fralles de usu opii* pag. 156.

tius incisione eum aperiatur, quam corrodentibus, quia corrodentia sæpe quid gangrænosi effecere. Ante perfectam maturationem vero ne aperias ipsum, sæpe enim alias fistulosus redditus est.

4. Anonæ penuriæ quantum licet præveniendum est tempore pestis, nam ex concursu morborum ex fame natorum cum peste non solum morbus periculofior succedit, verum etiam corpora humana ad suscipiendum miasma pestilentiale proniora facit alimentorum defectus.

5. Quia ex præcedentibus abunde patet, quod singularis corporis uniuscujuscunque individuorum singulorum præsertim inter divites quia etiam divites non semper habent bonos humores, dispositio, aerisque crasis ex toto perspecta nobis semper non sit, miasma pestilentiale pariter diversis circumstantiis & modis diversum in inficienda & propaganda peste appareat, nec non incerti semper maneamus, an non nunquam quædam ad nos ex Turcia adlatæ merces infectæ aere satis purificatae,

tæ, vel quia fortiter inclusæ vere contagiosæ existant; semper præcautio quædam ratione hominum vel rerum ex infectis locis ad nos advenientium præprioris temporibus urgentioribus pestilentialibus servanda erit, e contra reformanda etiam minis longa quarantæna.







**COUNTWAY LIBRARY OF MEDICINE**

PC

